




Allergie protocol

Algemeen

Naam:
Groep:
Geboortedatum:

Telefoonnummers:

Tel.nr. thuis:
Tel.nr. moeder:
Tel.nr. vader:
Tel.nr. werk moeder:
Tel.nr. werk vader:
Tel.nr. in geval van nood: 112 en als ouders niet bereikbaar zijn fam.:of fam.:
.....



**Plaats hier een
foto van**

Allergieën:

..... is allergisch voor
I.v.m. zijn/haar allergieën volgt hij/zij een- vrij dieet.

Vorzorgsmaatregelen:

- Voorkom blootstelling aan allergenen en sporen daarvan tijdens eet- en drinkmomenten door alleen producten te geven die de ouders hebben meegegeven of door etiketten te screenen op de aanwezigheid van de allergenen. Bij twijfel het product niet geven/of overleggen met ouders
- Voorkom (hand)contact met allergenen, bijv. tijdens knutselen (LET OP: er zijn kleisoorten/potloden die allergenen bevatten) en/of kookactiviteiten. Overleg met de ouders voor een alternatief
- Overleg met de ouders over bijzondere schoolactiviteiten zoals Paasviering, verjaardag leerkracht, schoolreisje etc..
- Noodmedicatie zit in blauwe medicatie toiletas in bureau van de leerkracht (instructie voor toediening is hier ook aanwezig)
- heeft eigen eten mee
- heeft een eigen traktatiedoos voor verjaardagen als een traktatie niet allergeen vrij is
- Op de dagen dat er is, is er een vaste persoon die zijn medicatie kan toedienen in geval van nood.
- In geval van afwezigheid een andere verantwoordelijke persoon aanwijzen.

Hoe herken je een ernstige reactie en hoe handel je dan?

Zodra , binnen krijgt ontwikkelt hij/zij binnen een half uur een acute allergische reactie.

Deze reactie is te herkennen aan één of meerdere van de volgende symptomen:

- Prikkelende tong/mond
- Benauwdheid
- Extreem niezen/rode ogen
- Galbulten (rode zwelling) over het hele lichaam
- Zwelling van delen van het lichaam (oren, gezicht)
- Braken
- Sufheid

In het geval van een milde allergische reactie:

Anthistaminicum medicatie (tabletten of drankje) geven en blijven observeren. Bij verergering van de klachten onderstaande stappen volgen.

In het geval van een ernstige allergische reactie:

Een Epipen/Jext bevat adrenaline pen, deze kan gegeven worden als de allergische reactie dusdanig is dat benauwd wordt of in shock raakt.

Handel als volgt in een noodsituatie:

- zijn/haar noodmedicatie (bijv. Epipen/Jext) toedienen, dit wordt gedaan door de verantwoordelijke die er is voor op deze dag
- 2e persoon wordt ingeschakeld om 112 te bellen, en te vertellen wat er aan de hand is
- Gedurende een allergische reactie blijven observeren en niet alleen laten
- Als de ambulance er is vertellen dat de Epipen/Jext is toegediend en de Epipen/Jext in de houder aan hen overhandigen, evt. dit protocol mee geven
- Ouders inlichten zodra mogelijk

De ouder(s)/verzorger(s) van

heeft (hebben) Kinderopvang Kyra verzocht om bovenstaand protocol uit te voeren bij vertoningen van een milde- of ernstige allergische reactie.

De verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van deze handelwijze blijft bij de ouder(s) / verzorger(s).

Naam :

Datum:

Handtekening: